



ЭНЗИМ

Кокцилад

Высококачественный антикокцидийный полиэфирный ионофорный антибиотик, вырабатываемый *Streptomyces albus*

- Профилактика и лечение эймериоза
- Сохранность и жизнеспособность молодняка животных и птицы
- Направленное угнетение ооцист кокцидий
- 1г препарата Кокцидан 12% содержит 120 мг салиномицина натрия, наполнитель и вспомогательные вещества.

Преимущества

- Препарат умеренно токсичен
- Практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта
- Оказывает свое действие в слизистой и подслизистой оболочках
- Практически полностью выводится из организма в неизменном виде за 3-4 дня
- Чередование с другими препаратами позволяет использовать его длительный срок
- Не оказывает побочного действия в рекомендуемых дозах
- Оптимально подобранный состав
- Стимуляция роста и развития молодняка

Условия хранения

24 месяца со дня производства в темном месте при температуре от 0 до 25°C

Дозировка препарата

0,5 кг/т корма

Фасовка:

Многослойные крафт- мешки с полиэтиленовой вкладкой по 20 кг

Применение

Препарат активен в отношении всех видов эймерий, паразитирующих у:

– птицы, в том числе *E. acervulina*, *E. mivati*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. brunetti*, *Eimeria tenella*, *E. mitis*, *E. praecox*

– у индеек — кокцидиоза, вызванного инфекцией *E. adenoides*, *E. meleagriditis*

– у гусей и уток — кокцидиоза, вызванного инфекцией *E. anseris*, *E. truncata*

– у свиней: *E. deblickei*, *E. guevardi*, *E. neodeblickei*, *E. Perminuta*, *E. polita*, *E. porsii*, *E. romaniae*, *E. scabra*, *E. spinosa*, *E. Scrofae*

– Для профилактики кокцидиоза бройлеров препарат применяют с первого дня жизни и исключают за 5 дней до убоя

– Для ремонтного и промышленного поголовья несушки Кокцидан применяют с первого дня жизни и до начала яйцекладки

ООО «ТД «Энзим»

21050, г. Винница,
ул. 1 Мая, 60
т/ф (0432)-555-622
info@enzim.biz
www.enzim.biz

